

## Rheum. Rhubarbe

**Frisson, sans refroidissement externe (observ. après une demi-heure environ).**

*Pesanteur de tout le corps, comme lorsqu'on s'éveille d'un sommeil très profond.*

*Lassitude des cuisses, comme si on les avait trop fatiguées.*

**Taciturnité, indolence.**

**Paresse taciturne.**

**Resserrement des pupilles avec une sorte d'inquiétude. (Si la dose a été forte, il persiste jusqu'à la seizième heure ; les pupilles sont alors plus dilatables.)**

**Céphalalgie constrictive, distensive, obnubilante, obtuse, occupant tout le cerveau, mais surtout, cependant, le vertex et les tempes.**

**Céphalalgie d'abord pressive, puis déchirante, jusqu'à l'occiput.**

**Céphalalgie pulsative.**

**Tranchées avant et pendant la selle, cessant après.**

**Nausée, vomiturition.**

**Dégoût pour le café, s'il n'est pas convenablement sucré.**

**Selles diarrhéiques excrémentielles, avec mucus.**

**Selles muqueuses grises.**

**Disposition à demander diverses choses avec impatience, et en pleurant.**

**Sensation de chaleur générale, sans soif (observ. à la deuxième heure ; la chaleur provoquée par la rhubarbe appartient certainement aux effets secondaires).**

**Chaleur et gonflement des veines des mains et des pieds, mais non des bras et des cuisses ; la face n'est pas chaude.**

*Sueur de la face moins que tiède, froide surtout aux environs du nez et de la bouche (observ. à la troisième heure).*

**Somnolence.**

*Inspiration stertoreuse pendant le sommeil (observ. à la première heure).*

**Sommeil inquiet, plaintif, la tête renversée.**

**Le soir, en dormant, délire ; il se promène sur son lit, les yeux fermés, ayant très chaud et sans parler.**

**Pendant le sommeil, les mains sont élevées sur la tête.**

**Pesanteur de tout le corps après le sommeil.**

**Après le sommeil, paupières agglutinées par une matière purulente.**

**Après le sommeil, l'intérieur de la bouche est enduit d'un mucus fétide.**

**Après le sommeil, goût putride de la bouche,**

**Après le sommeil, haleine fétide.**

**Après le sommeil, pression au scrobicule, qui se propage, en respirant, à travers le sternum, et se change en une douleur contusive.**

**Violente douleur lancinante, déchirante dans le pouce (observ. à la troisième heure).**

**Élancements isolés dans la poitrine (observ. à la sixième heure).**

**Élancements isolés dans les bras.**

***Douleur simple de toutes les articulations pendant le mouvement***

**(observ. pendant plusieurs heures, à partir de la douzième).**

**Engourdissement des membres sur lesquels on est couché.**

**Raideur du genou, douloureux pendant le mouvement (observ. après une forte dose, vers la vingtième heure).**

**Douleur des dents, comme si elles se brisaient ; allongement, vacillation des dents, (cariées) (observ. de la douzième à la vingtième heure).**

**Ardeur en urinant (observ. après une forte dose, vers la vingtième heure).**

**Anorexie.**

**Plénitude de l'estomac. comme après un repas trop copieux (observ. de la huitième à la douzième heure, et suivie quelquefois de somnolence).**

**Observations d'autres auteurs**

**Murpay, *appar., med.*, t. IV., p. 390-396..**

**Lueur copieuse ( de couleur jaune, d'après Menzel et Tillingius, exhalant l'odeur de la rhubarbe, d'après Menzel).**

**Elle purge et ensuite resserre le ventre.**

**Elle accélère la circulation du sang, elle augmente la fièvre.**

**Difficulté de respirer et anxiété plus forte.**

**Nausée.**

**Douleurs de ventre.**

**Vertu somnifère (après Fordice et Lentin).**

**Tranchées et gonflement du ventre (d'après Baker).**

**Délire.**

**Compression de la poitrine.**

**Prostration des forces (ces trois symptômes d'après Brockelsby).**

**Ardeur dans les reins, dans la vessie (Fallope).**

**Vertige (Sim. Paulli).**

**Retour**