

**Stramonium . Datura Stramonium (L).**

**Pomme épineuse**

(Suc des feuilles épaissi au soleil.)

**L'action dure le plus souvent vingt-quatre et au plus trente-six heures.**

**Refroidissement des extrémités.**

**Refroidissement de tout le corps.**

**Refroidissement et froid pendant huit heures.**

**Abattement de l'esprit.**

**Pleurs involontaires.**

**Ivresse (observ. quelquefois après huit heures).**

**Langueur, fatigue des pieds.**

**Désir opiniâtre de se coucher.**

**Toutes les évacuations sont supprimées.**

**Sécheresse de la gorge.**

**Difficulté, d'avalier.**

**Constriction de la gorge.**

**Difficulté d'avalier avec douleur pongitive dans la gorge.**

Difficulté d'avalier avec douleur (pressive) dans les glandes sous maxillaires.

Sensation dans le ventre comme s'il était fortement tendu.

***Gonflement mou du ventre.***

**Perte de l'appétit.**

**Nausée.**

**Vomissement bilieux après un léger mouvement ou en se redressant dans le lit.**

**Ptyalisme.**

***Engourdissement des membres.***

Catalepsie passagère.

**(Pression au scrobicule.)**

**Douleur déchirante dans le ventre, comme si on arrachait l'ombilic.**

**Elle se dirige ensuite vers la poitrine.**

**Douleurs constrictives déchirantes dans le dos et l'épigastre (observ. au bout d'une heure).**

*Douleur constrictive au milieu de l'épine dorsale, avec douleur constrictive de la partie postérieure de l'estomac qui lui correspond.*

*Douleur constrictive au milieu de l'épine dorsale.*

**Respiration pénible.**

**Respiration gênée.**

**Sensation de tournoiement dans la poitrine et ensuite chaleur à la face.**

**La nuit, après s'être couché, douleur sécante dans le sternum, elle disparaît pour l'émission de flatuosité, mais revient ensuite.**

Douleur de poitrine, pression au sternum provoquées par la parole.

**Bubon.**

**Rougeur de la face.**

Sensation de chaleur à la face après froid et refroidissement.

*Céphalalgie constrictive.*

**Délire loquace, il se plaint d'un chien qui lui déchire la poitrine à belles dents.**

*Gonflement d'un, de plusieurs membres,*

**Douleur pulsative des dents, comme si une partie allait tomber.**

*Douleur constrictive dans le sacrum.*

*Douleurs constrictives dans les cuisses.*

**Bouffées de chaleur.**

**Éruption miliaire rouge à la peau.**

**Chaleur, très grande sueur générale sans soif (observ. à la cinquième heure).**

**Ayant chaud, il désire être enveloppé de couvertures, et, s'il sort seulement le doigt hors du lit, il est tourmenté par le retour de douleurs furieuses.**

**Sommeil agité.**

**Rêves d'événements historiques.**

**Convulsion des membres. (Faut-il les rapporter aux effets secondaires ?)**

Douleur (lancinante ?) constrictive dans un point limité du dos, sensible même au toucher.

**Douleur du dos et en même temps du ventre comme contusive provoquée par le mouvement (observ. à la douzième heure).**

**Tache dans le dos, douloureuse spontanément et par le toucher.**

**Appétit augmenté.**

**Sensation comme d'excoriation dans l'intérieur de la bouche (observ. vers la vingt-quatrième heure).**

**(Je n'ai observé les symptômes suivants que parmi les reliquats et je ne puis encore dire quels appartiennent aux effets primitifs, quels aux secondaires.)**

Mémoire diminuée.

**Hémorroïdes coulant pendant plusieurs jours.**

**Sang caillé sortant par l'anus.**

**Règles augmentées, le sang menstruel sort par grands caillots.**

**Règles excessives, hémorragie de l'utérus avec douleur constrictive dans le ventre, les cuisses, les membres.**

**Observations d'autres auteurs**

**Cruger, Misc. nat. cur., déc. III ann. 2 obs. 68.**

**(Par la semence chez un adulte.)**

**Constriction de la gorge.**

**Vertige tel qu'il chancelle çà et là comme un homme ivre.**

**Trouble de l'esprit.**

**Des images variées se présentent à lui.**

**Extase.**

**J.-C. Grimm Eph. nat. c. cont. 9, observ. 94.**

**(Par la semence chez un enfant de 8 ans.)**

**Délire (après trois heures).**

**Sauts.**

**Gesticulations.**

**Rire.**

**Chant.**

Sueur abondante.

**Sommeil prolongé (pendant 24 heures).**

**Kellner, Bresl. Samml. 1727. (Pour une décoction de semence.)**

**Abolition des sens, de la vue, de l'ouïe.**

**Tremblements.**

**Agitation des membres.**

**Grincement des dents.**

**Visage gonflé, congestionné.**

**Contorsion des yeux.**

**Pouls tremblant, faible, inégal, parfois intermittent.**

**Borborygmes (mort au bout de 16 heures).**

**Aliénation (pendant 24 heures).**

**Délire léger.**

**Abr. Swaine, Newe Edimb. vers. II, p. 279.**

**(Par la décoction de 3 péricarpes.)**

**Vertige.**

**Désir de l'air libre.**

**Vacillation tremblante, comme dans l'ivresse.**

**Crainte de tomber.**

**Crainte de perdre l'esprit.**

**Besoin de se coucher.**

**Sensation de grande sécheresse à la langue et au gosier.**

**Sensation de sécheresse dans la poitrine.**

**Constriction extrême de la poitrine, en travers.**

**Bégaiement (après une demi-heure).**

**Insensibilité.**

**Inquiétude.**

**Murmure à voix basse.**

**Refroidissement intense général, des membres, du tronc.**

**Pouls grêle, fréquent.**

**Il s'agenouille, il se redresse sur ses genoux.**

**Il étend les bras en avant.**

**Il cherche avec les mains.**

**Yeux fixes, appesantis.**

**Aphonie (après quelque temps).**

**Torpeur ; le pouls a presque disparu.**

**Membres paralysés.**

**Stupidité (pendant six ou sept heures.).**

**Fureur effrénée, on peut à peine contenir le patient, qui se lève, frappe et cherche à saisir ceux qu'il rencontre.**

**Loquacité délirante, bavardage absurde.**

**Alternative de rectitude d'esprit et de délire.**

**Suppression des urines et des selles.**

**Insomnie (ces deux symptômes pendant les quatorze heures que dura l'empoisonnement).**

**Kaaw Boerhaave, Impet. fac, Hippocr., I. b., 1745, p. 282.**

**Ivresse.**

**Dilatation des pupilles.**

**Yeux brillants.**

**Rougeur de la face.**

**Chants.**

**Impudeur lascive.**

**Bégaiement. Yeux hagards, fixes, immobiles.**

**Tremblement des lèvres, des mains, des pieds.**

**Grincement des dents.**

**Convulsions.**

**Délire.**

**Décubitus sur le dos (au bout d'une heure), yeux largement ouverts, fixes.**

**Trismus, occlusion des lèvres.**

**Les mains sont fermées, à l'exception des pouces, mais on peut les ouvrir.**

**Contraction et extension lentes et répétées des membres.**

**Inspiration lente, expiration très rapide.**

**Pouls fréquent, intermittent.**

**Abolition des sens et des mouvements volontaires (catalepsie), la déglutition reste cependant libre.**

**Vomissement provoqué et convulsion des membres.**

**Sommeil profond, stertoreux, avec contraction de la jambe à de longs intervalles.**

**Vicat, Plant. vénen. de la Suisse, p. 248. (Par les fruits.)**

**Tristesse.**

**Aphonie.**

**Abolition du pouls.**

**Paralysie des membres.**

**Fureur.**

**Vertiges.**

**Insensibilité.**

Loquacité délirante.

**Pouls petit, fréquent, et enfin à peine perceptible.**

**Paralysie des jambes.**

**Fureur.**

**Exanthème pruriant.**

**Dilatation des pupilles.**

**J.-F. Lobstein, Obs de stram. Sem. virt. ven. in app. doss. Guérin.**

**Spoilmann, De pl. ven. absat. argent. 1766.**

(Par les semences, chez deux enfants.)

**Lassitude des membres (observ. après quatre heures).**

**Désir d'être couché.**

**Grande chaleur, avec bavardage pendant le sommeil.**

**Gonflement de la face, avec rougeur intense, des lèvres et des joues (observ. après quatorze heures).**

**Gonflement et occlusion des yeux, dilatation extrême des pupilles, agitation du globe oculaire en tous sens.**

**Ventre tuméfié, mais sans dureté.**

**Contractions alternatives des mains et des pieds.**

**Convulsions et délires provoqués surtout par le toucher, bientôt suivis de faiblesse.**

**Langue gonflée, faisant saillie hors de la bouche.**

**Constriction de la gorge, comme sous le coup d'une suffocation ou d'une apoplexie imminente.**

**Sommeil tranquille, en même temps les convulsions s'apaisent.**

**Grande chaleur, avec sueur douce, fréquence et mollesse du pouls.**

**Horreur de l'eau, comme dans l'hydrophobie, se convertissant en une fureur effrénée quand on leur mouillait les lèvres.**

**Pouls plus lent (après dix-huit heures), respiration plus libre, le gonflement disparaît, les convulsions et le délire persistent (la dilatation, l'immobilité des pupilles et le délire durèrent trente heures).**

**Comment de reb. in sc. nat. et med. gest., vol. II, p. 241.**

**Soif très pénible, avec salivation.**

**Greting, in Ludwiggii advers. med. pr., vol. 1, p. 259.**

**Obnubilation de la tête avec douleur (les symptômes suivants ont été observés successivement par Greting à diverses époques et chez divers individus).**

**Aberrations variées de la vue.**

**Faiblesse de la vue.**

**Anxiété.**

**Ventre paresseux, constipation.**

**Ventre relâché.**

**Augmentation de l'appétit.**

**Sommeil agité.**

**Sommeil tranquille.**

**Sueur souvent profuse.**

**Fièvre.**

**Flux abondant d'urine.**

**Lippitude.**

**Convulsion des yeux.**

**Soif intense.**



**Salivation.**

**Tranchées.**

**Hoquets.**

**Douleurs rhumatismales.**

**Prurit de tout le corps.**

Fourmillement.

Purpura.

**Gardane (Gazette de santé, 1773-1774, p. 14.)**

**Grande chaleur de tout le corps.**

**Kramer, Commerc. Litt. Nor. 1733, p. 251.**

**(Par la teinture alcoolique des semences.)**

**Délire furieux.**

**Doderlin, *Comm. litt. nor.* 1744, p. 15. (Par une décoction des feuilles.)**

Sensation mordicante dans l'estomac.

**Céphalée.**

**Rougeur de la face.**

**Engourdissement.**

**Convulsions.**

**Fowler, *Medical and Philos. Comment.* vol., V, p. 161.**

**(Par une drachme et demie de semences chez une jeune fille de six ans.)**

**Stupidité.**

**Gonflement du ventre.**

Gonflement de la face, des yeux. de la langue.

**Délire.**

**Céphalée.**

**Ibid (par une demi-drachme de semence chez une fille de trois ans).**

**Céphalalgie.**

**Hoquets.**

Gonflement de la face.

**Vomituration.**

**Van Eems, in h. Boerhaave proel. de morb. nerv. III, p. 227.**

**(Pour avoir aspiré de la poudre par le nez.)**

**Frissons au menton.**

**Büchner, Bresl. Samml. 1727. (Par la semence chez une adulte.)**

**Convulsions.**

**Apoplexie.**

**SCHOER, in Hufel, Journ. d. pr. arz., vol. X, pl. I, P. 195. (Par les semences,)**

Manie furieuse, incoercible.

Carphologie.

Elle rit.

**Elle tourne en rampant dans le lit.**

**Elle ne peut se tenir sur ses pieds.**

**Pupille dilatée, immobile.**

**Congestion du sang à la tête (les symptômes durèrent vingt-quatre heures).**

**Chph A Costa, ap. Schenck, lib., VII, observ. 139.**

**Aliénation d'esprit.**

**Rire.**

**Lamentations.**

**Sommeil.**

**Il parle à quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, et lui répond ; il ne se rappelle cependant pas cet entretien quand il revient à lui.**

**Stoerck, Lib. de Stram. Acon. Hyosc. Vien. 162, p. 5. (Par la vapeur.)**

**Céphalalgie obscure.**

**Retour**